


正 誤 表

「新・違いがわかる！ 同種・同効薬（下巻）（第1版 第1刷）」

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

頁	該当箇所	誤	正
2	表 1 続き SGLT2 阻害薬の「特徴と作用機序」列上から 2 行目	<u>体臭減少</u> が期待できる	<u>体重減少</u> が期待できる
18	表 糖尿病治療薬の配合剤一覧のメトアナ LD, HD の列	<u>アログリプチン 100mg</u> が含まれる	<u>アナグリプチン100mg</u> が含まれる
30	表 12 インスリン製剤の作用時間の「超速効型インスリンアナログ」の説明文 1 行目	・注射してから <u>約 1 時間 30 分後</u> に作用が現れ	・注射してから <u>10～20分</u> で作用が現れ

37	表1 片頭痛治療薬（保険適用あり）の全体像の「急性期治療薬」「そのほか」	右表に差し替え	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="902 245 1010 363">そのほか</td> <td data-bbox="1010 245 1341 363"> カフェイン（カフェイン） 無水カフェイン（無水カフェイン） 安息香酸ナトリウムカフェイン（アンナカ） </td> <td data-bbox="1341 245 1680 363"> ・ほかの急性期治療薬の眠気や倦怠感などの副作用軽減のために併用される </td> <td data-bbox="1680 245 1953 363"> ・中枢神経刺激作用 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="902 363 1010 448"></td> <td data-bbox="1010 363 1341 448"> ジメトチアジン（ミグリステン） 呉茱萸湯 </td> <td data-bbox="1341 363 1680 448"> ・他剤が奏効しない場合の選択肢 ・フェノチアジン系薬 ・漢方 </td> <td data-bbox="1680 363 1953 448"> ・抗セロトニン作用 ・抗ヒスタミン作用 </td> </tr> </table>	そのほか	カフェイン（カフェイン） 無水カフェイン（無水カフェイン） 安息香酸ナトリウムカフェイン（アンナカ）	・ほかの急性期治療薬の眠気や倦怠感などの副作用軽減のために併用される	・中枢神経刺激作用		ジメトチアジン（ミグリステン） 呉茱萸湯	・他剤が奏効しない場合の選択肢 ・フェノチアジン系薬 ・漢方	・抗セロトニン作用 ・抗ヒスタミン作用
そのほか	カフェイン（カフェイン） 無水カフェイン（無水カフェイン） 安息香酸ナトリウムカフェイン（アンナカ）	・ほかの急性期治療薬の眠気や倦怠感などの副作用軽減のために併用される	・中枢神経刺激作用								
	ジメトチアジン（ミグリステン） 呉茱萸湯	・他剤が奏効しない場合の選択肢 ・フェノチアジン系薬 ・漢方	・抗セロトニン作用 ・抗ヒスタミン作用								
87	図 メマンチンとアマンタジンの構造式	メマンチンとアマンタジンの構造式が逆	 <p>アダマンタン骨格 メマンチン アマンタジン</p>								
124	「Key Point」2つ目	・ラクツロースの適応は～	・ラクツロース（モニラック，ラクツロースシロップ，ラクツロース経口ゼリー）の適応は～								
124	本文下から 2 行目・3行目	～にしか適応がありません.	～にしか適応がありません（ラグノスNF経口ゼリーのみ成人の慢性便秘に適応があります）.								

2022年7月15日
株式会社南江堂